
Programme de colle : semaine 10
du 3 au 7 décembre 2018

Diagonalisation

1. Diagonalisation naïve des matrices carrées et applications
2. Sous-espaces stables par un endomorphisme
3. Éléments propres d'un endomorphisme et d'une matrice carrée
4. Diagonalisabilité d'un endomorphisme et d'une matrice carrée
Endomorphismes diagonalisables : existence d'une base de vecteurs propres i.e. dans laquelle la représentation matricielle est diagonale, caractérisation par les sous-espaces propres ou leurs dimensions, cas d'un endomorphisme admettant n valeurs propres en dimension n . Matrices carrées diagonalisables, caractérisation par les sous-espaces propres ou leurs dimensions, cas d'une matrice de $M_n(\mathbb{K})$ admettant n valeurs propres, lien avec la trace.

Compléments sur les variables aléatoires réelles, variables aléatoires à densité

1. Généralités sur les variables aléatoires réelles
Notion de variable aléatoire réelle. Théorèmes opératoires (admis). Loi d'une variable aléatoire réelle, tribu associée. Fonction de répartition d'une variable aléatoire, propriétés caractéristiques, caractérisation de la loi par la fonction de répartition, cas d'une variable discrète. Variables aléatoires indépendantes.
2. Variables aléatoires à densité
Une variable aléatoire réelle X est à densité si sa fonction de répartition F_X est continue sur \mathbb{R} et de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} privé éventuellement d'un nombre fini de points. Densité d'une telle variable X : toute fonction f_X à valeurs positives ou nulles sur \mathbb{R} , égale à la dérivée de la fonction de répartition sur \mathbb{R} sauf peut-être en un nombre fini de points. Existence et interprétation d'une densité : $\mathbb{P}(X = x) = 0$ mais $\mathbb{P}(x < X \leq x + h) \sim f_X(x) \cdot h$ lorsque $h \rightarrow 0$ (si $f_X(x) = F'_X(x) \neq 0$). Expression intégrale de la fonction de répartition à l'aide de la densité, caractérisation de la loi par la densité. Exemple des lois uniforme sur $[0, 1]$ et exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. Densité de $Y = \varphi(X)$ pour quelques fonctions φ classiques (le « premier théorème de transfert » n'a pas été énoncé).
3. Moments d'une variable aléatoire à densité
Moment d'ordre n d'une variable X à densité f_X : $\int_{-\infty}^{+\infty} t^n f_X(t) dt$ en cas de convergence (automatiquement absolue, les seules bornes de généralisation en lesquelles la convergence n'est pas automatique sont $\pm\infty$). Espérance, positivité, existence pour une variable presque sûrement bornée, théorème de transfert : espérance de $\varphi(X)$ lorsque φ est continue sauf peut-être en un nombre fini de points (avec toutes les réserves nécessaires), développement de $\mathbb{E}(aX + b)$. Variance, l'existence équivaut à celle du moment d'ordre 2, formule de Koëning-Huygens, développement de $\mathbb{V}(aX + b)$.
4. Fonctions de variables aléatoires réelles (tout est admis dans ce paragraphe)
Si X et Y sont deux variables aléatoires indépendantes à densités f_X et f_Y dont le produit de convolution $f_X \star f_Y$ est continu sur \mathbb{R} sauf peut-être en un nombre fini de points (condition réalisée si f_X ou f_Y est bornée), alors $f_X \star f_Y$ est une densité de $X + Y$. Les résultats suivants concernent tous types de variables aléatoires (non nécessairement discrètes ou à densité) : existence d'une espérance par domination, linéarité et croissance de l'espérance, espérance du produit et variance de la somme de deux variables indépendantes.