

# Suites et fonctions d'une variable

## Feuille d'exercices

1 Étudier la convergence, lorsque  $n \rightarrow \infty$ , de :

1.  $\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n [kx]$  ( $x \in \mathbb{R}$ );
2.  $\frac{3n^2 - \sin n}{2(n+5)^2 \cos(n\pi/7)}$ ;
3.  $\left( \left( \frac{\ln(x+n)}{\ln n} \right)^n - 1 \right) \ln n$  ( $x \in \mathbb{R}$ );
4.  $\left( e - \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^{\sqrt{n^2+2} - \sqrt{n^2+1}}$ .

2 Caractériser la convergence d'une suite d'entiers relatifs.

3 1. Démontrer le théorème de Cesàro : si une suite réelle  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  converge vers  $\ell$ , alors la suite de terme général

$$v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k, \quad n \geq 1,$$

converge également vers  $\ell$ . La réciproque est-elle vraie ?

2. En déduire le lemme de l'escalier : si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite réelle alors

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_{n+1} - u_n = \ell \in \mathbb{R} \quad \implies \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{n} = \ell.$$

3. a. Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite de réels strictement positifs. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell \in \mathbb{R}_+ \quad \implies \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \ell.$$

b. En déduire les limites, lorsque  $n \rightarrow \infty$ , de

$$\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}, \quad \frac{1}{n} \sqrt[n]{n(n+1) \cdots (n+n)}, \quad \frac{1}{n^2} \sqrt[n]{\frac{(3n)!}{n!}}.$$

4 Soient  $a$  et  $b$  deux réels strictement positifs.

1. Montrer que les suites  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définies par les conditions initiales  $a_0 = a$  et  $b_0 = b$  ainsi que les relations de récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$$

convergent vers la même limite. Leur limite commune est appelée moyenne arithmético-géométrique des réels strictement positifs  $a$  et  $b$ .

2. Écrire un algorithme permettant de calculer une valeur approchée à la précision  $10^{-n}$  de la moyenne arithmético-géométrique de  $a$  et  $b$ .

5 Étudier les suites réelles  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de conditions initiales  $u_0 > 0$  et  $u_1 > 0$  définies par la relation de récurrence  $u_{n+2} = \sqrt{u_n u_{n+1}}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

6 Étudier les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  définies par leur condition initiale et la relation de récurrence (valable pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ) précisées :

1.  $u_0 \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$  et  $u_{n+1} = \frac{1+u_n}{1-u_n}$ ;
2.  $u_0 > -\frac{1}{2}$  et  $u_{n+1} = \ln(1+2u_n)$ ;
3.  $u_0 \in \mathbb{R}$  et  $u_{n+1} = \cos u_n$ ;
4.  $u_0 \in \mathbb{R}$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{3}(4-u_n^2)$ ;
5.  $u_0 > 1$  et  $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n^2 - 1}$ ;
6.  $u_0 > 0$  et  $u_{n+1} = \frac{e^{-u_n}}{u_n}$ .

7 Soient  $a \in \mathbb{R}$  et  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite réelle telle que  $u_0 = 0$  et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + \frac{1}{2}(a - u_n^2).$$

1. Étudier les variations et les points fixes de la fonction  $f : x \mapsto x + \frac{1}{2}(a - x^2)$ .
2. Quel est le comportement de la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  lorsque  $a < 0$  ?  $a = 0$  ?  $a = 4$  ?
3. On suppose  $0 < a < 4$ .
  - a. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $\frac{a}{2} \leq u_n \leq 2$ .
  - b. Montrer que :

$$\forall n \geq 1, \quad |u_{n+1} - \sqrt{a}| \leq M |u_n - \sqrt{a}| \quad \text{où} \quad M = \max\left(\frac{\sqrt{a}}{2}, 1 - \frac{\sqrt{a}}{2} - \frac{a}{4}\right).$$

c. En déduire que la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.

4. On suppose  $a > 4$ .

- a. Quelles sont les limites éventuelles de  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ?
- b. Justifier que si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $\ell$ , alors il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall n \geq N, \quad |u_{n+1} - \ell| \geq \frac{\sqrt{a}}{2} |u_n - \ell|.$$

c. Conclusion ?

8 1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , l'équation  $x^n + x = 1$  d'inconnue  $x \in [0, 1]$  admet une unique solution que l'on note  $x_n$ .

2. Étudier la monotonie et la convergence de la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ , préciser sa limite.

3. On pose  $y_n = 1 - x_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- a. Montrer que  $\ln y_n \sim -ny_n$  et en déduire que  $\ln y_n \sim -\ln n$ .
- b. En déduire un équivalent de  $y_n$  puis un développement asymptotique de  $x_n$ .

9 1. Montrer que pour  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$  donné, l'équation  $x + x^2 + \cdots + x^n = 1$  d'inconnue  $x \in ]0, 1[$  admet une unique solution notée  $x_n$ .

2. Montrer que la suite  $(x_n)_{n \geq 2}$  est convergente. On note  $\ell$  sa limite.

3. Calculer de deux façons la limite de  $(x_n^{n+1})_{n \geq 2}$  et en déduire la valeur de  $\ell$ .

4. Déterminer la limite de la suite de terme général  $(2x_n)^{n+1}$ ,  $n \geq 2$ , et en déduire un développement asymptotique de  $x_n$  lorsque  $n \rightarrow \infty$  de la forme  $x_n = a + by^n + o(y^n)$  avec  $a, b \in \mathbb{R}$  et  $y \in ]0, 1[$  à expliciter.

**10** Démontrer que la fonction  $\sin n$  n'admet pas de limite en  $+\infty$ .

**11** Étudier les variations de chacune des fonctions suivantes et en esquisser le graphe puis préciser si elles sont injectives, surjectives et bijectives (on donnera une justification graphique puis analytique) :

1.  $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \ln(e^x - x) - 1$ ;
2.  $f : x \in \mathbb{R}^* \mapsto x - \frac{1}{x}$ ;
3.  $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{2}e^{2x} - e^{-x}$ ;
4.  $f : x \in \mathbb{R} \mapsto x^3 - 3x + 1$ .

**12** Soient  $f$  et  $g$  deux fonctions continues sur  $[0, 1]$ , à valeurs dans  $[0, 1]$ , telles que  $f \circ g = g \circ f$ .

♣ On désire montrer qu'il existe  $x_0 \in [0, 1]$  tel que  $f(x_0) = g(x_0)$ . On raisonne pour cela par l'absurde : on suppose qu'un tel point n'existe pas. On note  $f, f^2, \dots, f^n, \dots$  les itérés de  $f$  et de même  $g, g^2, \dots, g^n, \dots$  ceux de  $g$ .

1. Justifier que, quitte à permuter  $f$  et  $g$ , il existe  $\varepsilon > 0$  tel que pour tout  $x \in [0, 1]$ ,  $g(x) \geq f(x) + \varepsilon$ .
2. Montrer que, pour tous  $x \in [0, 1]$  et  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $g^n(x) \geq f^n(x) + n\varepsilon$ .
3. Conclure.

**13** Établir les inégalités :

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \frac{2}{\pi}x \leq \sin x \leq x.$$

**14** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$  par  $f : x \mapsto (\ln x)/(x - 1)$ .

1. Justifier que  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$  puis que  $f$  est prolongeable par continuité en 1. On notera encore  $f$  le prolongement de  $f$  à  $\mathbb{R}_+^*$ .
2. Justifier que  $f$  est dérivable en 1 :
  - a. à l'aide d'un développement limité ;
  - b. en étudiant la limite de  $f'(x)$  lorsque  $x \rightarrow 1$ .

**15** Soit  $f : [0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$ , majorée et à dérivée croissante. Montrer que  $f$  est décroissante.

**16** Pour  $n \in \mathbb{N}$  donné, on pose :

$$P_n = \frac{1}{2^n n!} \left( (X^2 - 1)^n \right)^{(n)}.$$

1. Montrer que  $P_n$  est un polynôme de degré  $n$ , pair ou impair selon la parité de  $n$ .
2. Montrer que  $P_n(1) = 1$  et en déduire la valeur de  $P_n(-1)$ .
3. Montrer que  $P_n$  admet  $n$  racines deux-à-deux distinctes dans l'intervalle  $] -1, 1[$ .

**17** On définit la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  des intégrales de Wallis par la formule :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, dt.$$

1. Calculer  $I_0, I_1$  et  $I_2$  et montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \, dt.$$

2. Pour  $n \geq 2$ , établir une relation de récurrence entre  $I_n$  et  $I_{n-2}$ .

3. Montrer que la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante et en déduire que  $I_n \sim I_{n-1}$  lorsque  $n \rightarrow \infty$ .

4. Montrer que la suite  $(nI_n I_{n-1})_{n \in \mathbb{N}^*}$  est constante ; calculer sa valeur. En déduire un équivalent de  $I_n$  en fonction de  $n$ .

5. Pour  $p \in \mathbb{N}$ , exprimer  $I_{2p}$  et  $I_{2p+1}$  à l'aide de factorielles et établir la formule de Wallis :

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{(2p)!!}{(2p-1)!! \sqrt{2p+1}},$$

où l'on a noté, pour tout  $q \in \mathbb{N}^*$  :

$$(2q)!! = (2q) \times (2q-2) \times \dots \times 4 \times 2 \quad \text{et} \quad (2q+1)!! = (2q+1) \times (2q-1) \times \dots \times 3 \times 1.$$

**18** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction T-périodique continue telle que  $\int_0^T f(t) \, dt = 0$ .

1. Justifier que  $f$  admet une primitive T-périodique.
2. En déduire que pour tous  $a, b \in \mathbb{R}$ ,

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(\lambda t) \, dt = 0.$$

**19** On va démontrer dans cet exercice que le nombre réel  $e$  est irrationnel. Pour cela, on raisonne par l'absurde : on suppose que  $e \in \mathbb{Q}$ .

1. Montrer, à l'aide d'une formule de Taylor, que pour  $n \in \mathbb{N}$  assez grand, l'intégrale

$$I_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t \, dt$$

est alors un entier relatif.

2. Montrer que la suite  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0.
3. Conclure.

**20** En utilisant une formule de Taylor, montrer que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

**21** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$ . Pour  $a \in \mathbb{R}$ , déterminer

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - 2f(a) + f(a-h)}{h^2}.$$

**22** Déterminer la limite des fonctions suivantes au point considéré :

1.  $x \mapsto \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x, x \rightarrow +\infty;$       4.  $x \mapsto x \ln(\ln(1+x)), x \rightarrow 0;$   
 2.  $x \mapsto \frac{\sqrt[3]{x^2+1} + x}{5 + \sqrt{3x^2 - x + 2}}, x \rightarrow +\infty;$       5.  $x \mapsto (2e^{\sin x} - \cos x)^{\cotan x}, x \rightarrow 0;$   
 3.  $x \mapsto \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}, x \rightarrow 0 \quad (b \neq 0);$       6.  $x \mapsto x \left( \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{2x} \right), x \rightarrow +\infty.$

**23** Déterminer le développement limité des fonctions suivantes à l'ordre et voisinage du point indiqués :

1.  $DL_2(0) : x \mapsto \ln(2 \cos x + \sin x);$       4.  $DL_3(\pi/4) : x \mapsto \tan x;$   
 2.  $DL_2(0) : x \mapsto e^{\sqrt{1+x}};$   
 3.  $DL_4(0) : x \mapsto \tan x;$       5.  $DL_2(1) : x \mapsto \frac{e}{e^x - e} - \frac{1}{x-1}.$

## Indications

- 1** 1. La partie entière  $\lfloor x \rfloor$  d'un réel  $x$  est par définition le plus grand entier inférieur ou égal à  $x$ ; elle est donc caractérisée par les conditions  $\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$  et  $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ . En renversant ces inégalités, obtenir un encadrement de  $\lfloor x \rfloor$ .
2. Trouver un équivalent du numérateur et du dénominateur puis montrer que la convergence de cette suite équivaut à celle de la suite de terme général  $\cos(n\pi/7)$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .
3. Trouver un équivalent de chaque parenthèse.
4. Trouver un équivalent de la parenthèse et de l'exposant.
- 2** Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ . Intuitivement, la suite  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est convergente si, et seulement si, elle est stationnaire, i.e. constante à partir d'un certain rang. Un sens est évident. Pour l'autre, observer que si  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge, alors  $(u_{n+1} - u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers 0; le recours aux  $\varepsilon$  permet alors de conclure.
- 3** 1. Commencer par traiter le cas  $\ell = 0$ . Pour  $\varepsilon > 0$  donné, soit  $N \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,  $|u_n| \leq \varepsilon/2$ . Justifier l'inégalité
- $$\forall n \geq N, \quad |v_n| \leq \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^{N-1} u_k \right| + \frac{1}{n} \sum_{k=N}^n |u_k|$$
- et en déduire l'existence de  $N' \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $|v_n| \leq \varepsilon$ . Traiter ensuite le cas  $\ell \in \mathbb{R}$  en considérant la suite de terme général  $u_n - \ell$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .
2. Appliquer le résultat de la question 1. à la suite de terme général  $u_{n+1} - u_n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .
3. a. Si  $\ell > 0$ , appliquer le résultat de la question 2. à la suite de terme général  $\ln u_n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Si  $\ell = 0$ , se livrer à de nouvelles epsiloneries.
- b. Pour chacune des suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  proposées, appliquer le résultat de la question 3.a. à la suite de terme général  $v_n = u_n^n$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ .
- 4** 1. Comment établir la convergence d'une suite sans connaître à l'avance la valeur de sa limite? On utilisera l'inégalité arithmético-géométrique (à retenir!): pour tous  $x, y \in \mathbb{R}_+$ ,  $\sqrt{xy} \leq (x+y)/2$ ; démonstration: développer  $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$ .
2. Remarquer que les suites  $(a_n)_{n \geq 1}$  et  $(b_n)_{n \geq 1}$  sont adjacentes.
- 5** Étudier la suite de terme général  $\ln u_n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , de façon à transformer la relation de récurrence donnée en une relation de récurrence linéaire.
- 6** 2. La fonction  $f$  sous-jacente est croissante, de sorte que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est monotone. L'étude des points fixes de  $f$  fait apparaître deux intervalles stables; distinguer selon que  $u_0$  appartient à l'un ou l'autre.
3.  $[0, 1]$  est un intervalle stable. Étudier les deux suites extraites principales ou appliquer l'inégalité des accroissements finis pour montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge.
5.  $]1, +\infty[$  est un intervalle stable. Étudier les deux suites extraites principales pour montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  diverge de seconde espèce.

- 8** 1. Considérer la fonction  $f_n : x \mapsto x^n + x$ .
2. Comparer  $f_{n+1}(x_n)$  et  $f_{n+1}(x_{n+1})$ .
3. a. Justifier qu'on peut composer le premier équivalent par  $\ln$ .
- 9** 1. Étudier la fonction  $f_n : x \mapsto x + x^2 + \dots + x^n$ .
2. Montrer que la suite  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est décroissante; pour comparer  $x_n$  et  $x_{n+1}$ , considérer  $f_n(x_n)$  et  $f_n(x_{n+1})$ .
3. Utiliser la décroissance de  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  puis exprimer  $x_n^{n+1}$  en fonction de  $x_n$  (sans puissance).
4. À l'aide d'un équivalent, montrer que la suite de terme général  $\ln((2x_n)^{n+1})$  converge vers 0. En déduire un équivalent de  $x_n^{n+1}$  puis de  $x_n - \ell$ .
- 10** Utiliser la caractérisation séquentielle.
- 12** 1. Commencer par montrer que la fonction  $g - f$  est d'un signe strict constant, qu'on peut supposer positif (quitte à permuter  $f$  et  $g$ ). Améliorer ensuite l'inégalité  $g - f > 0$  en  $g - f \geq \varepsilon$ .
2. Raisonner par récurrence.
- 13** La fonction  $\sin$  est concave sur  $[0, \pi/2]$ .
- 14** 2. b. Utiliser le théorème des accroissements finis pour relier le taux d'accroissement à la dérivée.
- 15** Raisonner par l'absurde. Justifier que si  $f$  n'était pas décroissante, il existerait deux réels  $x_0 \geq 0$  et  $m > 0$  tels que pour tout  $x \geq x_0$ ,  $f'(x) \geq m$  et aboutir à une contradiction.
- 16** 3. Appliquer le théorème de Rolle  $n$  fois au polynôme  $(X^2 - 1)^n$ . Plus précisément, montrer par récurrence sur  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$  que  $((X^2 - 1)^n)^{(k)}$  admet 1 et  $-1$  pour racines de multiplicités  $n - k$  et  $k$  autres racines deux-à-deux distinctes dans l'intervalle  $] -1, 1[$ .
- 17** 1. Pour  $I_2$ , linéariser  $\cos^2 t$ . Pour la nouvelle expression de  $I_n$ , utiliser un changement de variable affine transformant sinus en cosinus et préservant l'intervalle d'intégration  $[0, \pi/2]$ .
2. Utiliser une intégration par parties. Écrire  $\sin^n t = (\sin^{n-1} t)(\sin t)$ .
3. En utilisant la décroissance de  $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et la question 2., encadrer le quotient  $I_{n-1}/I_n$  par deux suites convergeant vers 1.
5. Conjecturer une expression et l'établir par récurrence ou utiliser un produit télescopique :

$$I_{2p} = I_0 \prod_{k=1}^p \frac{I_{2k}}{I_{2k-2}}, \quad I_{2p+1} = I_1 \prod_{k=1}^p \frac{I_{2k+1}}{I_{2k-1}}.$$

- 18** 1. L'intégrale d'une fonction  $T$ -périodique sur un segment de longueur  $T$  est indépendante du choix du segment d'intégration.  
2. Justifier que les primitives de  $f$  sont bornées.
- 19** 1. Appliquer la formule de Taylor avec reste intégral à la fonction exponentielle sur le segment  $[0, 1]$ .  
2. Utiliser un encadrement.  
3. Justifier que  $I_n = 0$  pour  $n$  assez grand et en déduire une contradiction.
- 20** À  $x \in \mathbb{R}$  fixé, appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à la fonction exponentielle sur le segment  $[0, x]$ .
- 21** Utiliser une formule de Taylor.
- 22** Utiliser (à bon escient) équivalents et développements limités.